

發行單位

財團法人中華景康藥學基金會

發行地址

10050台北市林森南路33號
201室

電話

02-23930576

傳真

02-23512653

網址

www.ckf.org.tw

召集人

姜紹青

編審委員

林淑文、蔡振華、鄭吉元
謝玲玲、蘇芳玉

印刷

先施印通股份有限公司

2014年6月 初版

ISBN/
978-986-82336-5-2

版權所有，翻印必究

歡迎各大企業、公益團體、
熱心人士捐款助印

每冊工本費100元

乳癌用藥手冊



乳癌 用藥手冊



財團法人中華景康藥學基金會

序

乳癌為我國婦女發生率第一位的癌症，我國每十萬人口發生率在1995年是28.46人，但根據我國國民健康局在2014年4月15日發布之消息，已大幅成長升高至64.3人，而且好發年齡還有年輕化的趨勢。不幸中的大幸是若能早期發現並配合治療，乳癌的五年存活率可高達九成，而標靶新藥的研發上市，也讓一些晚期的乳癌患者有了一線曙光。

有鑑於近幾年來在乳癌用藥方面，不斷有更新的使用建議，且有不少創新產品通過審核上市，因此本會重新編修「乳癌用藥手冊」。期能使病人不再因無法即時取得重要用藥知識，而感到徬徨無助，讓病人能循序漸進地認識相關抗癌藥品的效益與風險，當副作用出現時也能有心理準備，不至於驚慌失措，而會了解什麼情況下可以自己處置、什麼情況下須緊急就醫；如此一來也增加了病人服藥的安全性及順從性，讓他們的病情獲得更好的控制，也能得到最佳的效益。

本會成立三十年來，一直為達成「以民眾為中心的健康醫療文化」的目標而努力，希望此手冊的編修，可有助擴大乳癌用藥知識的傳播，不只提升病人的存活率，且讓病人有更好的生活品質。

財團法人中華景康藥學基金會

董事長

2014年6月

編審委員簡介

召集人

姜紹青 和信治癌中心醫院藥劑科副主任

編審委員（按姓名筆劃排列）

林淑文 臺灣大學臨床藥學研究所助理教授

蔡振華 振興醫院血液腫瘤科主治醫師

鄭吉元 林口長庚紀念醫院血液腫瘤科臨床藥師

謝玲玲 前臺大醫院藥劑部組長

蘇芳玉 林口長庚紀念醫院藥劑部藥師

財團法人中華景康藥學基金會


財團法人中華景康藥學基金會成立於1983年，成員是一群熱心公益的臺大藥學系校友。以「獎助藥學教育設施、提倡藥學研究，以及促進藥學事業發展」為宗旨，致力於關懷社會、走入社區，並服務民眾。

景康網址：www.ckf.org.tw

捐款資訊

戶名：財團法人中華景康藥學基金會

郵政劃撥帳號：16242216



Q & A

1. 乳癌可以治癒嗎？ 08
2. 我曾經餵母乳、家族中也不曾有人得到乳癌(不是高危險群)…，為什麼我還會得乳癌？ 09
3. 國際知名影星在得知自己具有BRCA-1的致癌基因後，即積極進行乳房切除手術…… 10
4. 我可以同時服用中藥嗎？ 11
5. 我可以吃哪些保健食品？哪些不能吃？ 12
6. 乳癌的治療藥物會造成骨質疏鬆嗎？我已經有骨質疏鬆該怎麼辦？ 13
7. 乳房要全部切除還是保留？如果保留一部份，會不會增加日後復發的機率？ 14
8. 術後長期疼痛是正常的身體反應嗎？需要依賴吃止痛藥…… 15

認識乳癌

1. 如何及早發現乳癌 18
2. 乳癌的治療方式 21



藥物介紹

1. 荷爾蒙治療藥物 26
2. 化療藥物 35
3. 標靶藥物 59
4. 乳癌輔助性化學治療 68
5. 其他藥物 69
6. 近期新增化療藥品 90

副作用

1. 白血球低下 92
2. 血小板減少 93
3. 貫血 95
4. 嘔心/嘔吐 96
5. 口腔黏膜損傷 97
6. 食慾不振 98
7. 腹瀉 99
8. 便秘 100
9. 掉頭髮 101
10. 皮膚/指甲色素沉澱 102
11. 生殖機能損傷 103
12. 手足症候群 104


中文索引 106

英文索引 111





塗鴉牆





乳癌可以治癒嗎？

隨著藥物以及荷爾蒙製劑的進步，乳癌治療效果比以前更好。整體乳癌的10年存活率已可達60%。初期乳癌的患者（例如分期為原位癌、第一期者）更因為積極的治療，在一開始就徹底殲滅癌細胞，使乳癌的治癒成為可能。目前一期乳癌十年存活率高達85%至90%，零期乳癌甚至100%。近年來國人對乳癌認知提高，早期發現的比例也愈來愈高，以致於發現時的腫瘤較小，腋下淋巴轉移數目也減少，所以發生轉移的機率也大大降低，因此乳癌獲得控制及治癒的機率都大幅提高。

我曾經餵母乳，家族中也不曾有人得到乳癌(不是高危險群)…，為什麼我還會得乳癌？



某些因素被認為會促使乳癌的發生機率增加，例如具有家族性乳癌基因(BRCA)突變的婦女或有家族病史的婦女。具有BRCA基因突變的婦女終身罹患乳癌或卵巢癌的機會高達80%；若沒有BRCA基因突變但有家族病史的婦女，罹患乳癌的機率，仍是一般女性的四倍。雖然這些危險因子看似主宰罹患乳癌的機率，但由另一個角度來看，乳癌患者中發現有BRCA-1、BRCA-2基因突變的只有5%，顯示還有高達95%的乳癌，是因為其他尚未發現的原因造成，例如可能還有其它的突變基因、荷爾蒙或未知的環境因素等。所以不能解釋成不是高危險群就不會得乳癌，只是以目前醫學上觀察認為機率相對較低。



國際知名影星在得知自己具有BRCA-1的致癌基因後，即積極進行乳房切除手術，預防乳癌發生。如果檢測後發現自己也有BRCA-1、BRCA-2的基因，是否也建議先進行乳房切除手術，事先預防呢？

BRCA1突變相關的乳癌以三陰性乳癌為主(estrogen receptor(-)、progesterone receptor(-)及Her2(-))，但是隨著病人年紀的增長，三陰性乳癌的比例逐漸降低，國內到目前為止並無本土大規模的相關BRCA1資料可以做為參考，只有少數家族基因研究呈現BRCA1陽性但突變位置也不一定具有臨床意義。所以應該非常謹慎的處理是否檢驗及判讀有關BRCA1，BRCA2基因的問題。

我可以同時服用中藥嗎？



針對癌症，最重要的治療原則是：早期發現、早期治療。若要結合中西醫的方式進行正規治療，一定要經由合格中醫師診治，拒絕密醫及偏方，以免延誤病情。相信均衡營養加上家人及信仰的支持，必能達到最佳的治療結果。

中西醫結合共同治療腫瘤，最主要目的即在提高治療近期、遠期的療效及生存率，防止腫瘤的復發或轉移，提高患者的免疫力及生活品質。此外，中醫藥也許可能減輕放射、化學治療的副作用。

現在很多醫院皆有中醫部進行中西醫整合治療，病友可多詢問，如果併用中醫與西醫治療，必須注意其藥品的交互作用。但不建議完全捨棄西醫治療而只相信中醫治療就能治癒的論調。



我可以吃哪些保健食品？哪些不能吃？

癌症的形成絕不是單一機轉可以解釋的，也就是說，沒有任何一種食物或保健食品，吃了便能改善體質或對抗癌症。

舉例來說，近年來大豆食品在美國成了熱門養生食品，不過若干針對動物所作的研究顯示，大豆所含的異黃酮類似雌激素，會刺激腫瘤增生，增加乳癌復發機率；但最近中國針對5,000多位乳癌患者進行長達四年的追蹤與統計，卻又發現攝取適量大豆食品者，乳癌復發與死亡機率降低。所以針對不同研究對象或不同的攝取量，都可能影響研究結果。因為所有的保健食品都不可能像藥品一樣作大規模的臨床試驗且耗費鉅資來證明有效或無效，所以很難建議病友該或不該服用保健食品。如果您想要服用保健食品，建議與您的醫師或藥師討論後再開始使用。

乳癌的治療藥物會造成骨質疏鬆嗎？我已經有骨質疏鬆該怎麼辦？



抑制卵巢功能本身就是治療乳癌的方式之一，治療乳癌的化學藥物大多會影響卵巢功能，影響時間愈長、程度愈大者，引發骨質疏鬆機會愈大（因為卵巢分泌的動情激素會減少骨質流失）。若已有骨質疏鬆者建議請醫師做確定的檢查再決定是否要用藥物治療骨質疏鬆。

一般而言，規律運動、曬太陽、戒煙、少飲酒、補充鈣質（每天元素鈣1200毫克）、維生素D（每天400至800單位），是基本的減緩骨質疏鬆的有效作法。



7 乳房要全部切除還是保留？如果保留一部份，會不會增加日後復發的機率？

十九世紀末開始「根除性乳房切除術」的研究者認為，乳癌是一種局部性疾病，所以主張局部切除愈廣泛愈徹底愈好，至二十世紀中期才略作改良，保留胸大肌，但整個乳房仍然切除，就是所謂的改良型根除手術。直到1970年代，觀察發現乳癌是一種全身性疾病，在腫瘤形成過程中，已經有微小的癌細胞散至全身，所以大範圍手術無法降低疾病復發率，所以提倡切除腫瘤本身即可。根據最近長達二十年的追蹤研究結果顯示，乳房保留手術加上術後放射治療，治療後的成效與改良型根除手術相同。乳房保留手術其適用範圍包括腫瘤小於3公分、單一病灶、不在乳頭及乳暈附近之第一、二期乳癌患者，當然第三期乳癌病人亦可先利用化療或荷爾蒙治療讓腫瘤縮小，之後仍有機會進行乳房保留手術。


術後長期疼痛是正常的身體反應嗎？需要依賴吃止痛藥緩解疼痛症狀，或有其他方式可以改善嗎？




根據2014 Jan JAMA期刊的研究，在860份有效問券：女性病患在接受乳房保留手術或乳房全切除手術後的十二個月後接受調查發現有24%的人有慢性疼痛，僅有34.5%的人表示沒有疼痛問題。女性表達輕微、中度、極重度疼痛的比例分別為：49.5%、12.7%和3.7%；可見術後疼痛的問題是極需被處理的議題，目前並沒有一致性的解決方法被醫界所採納，但復健及使用止痛藥是常見的方式。



塗鴉牆



認識乳癌






如何及早發現乳癌

認識乳癌

乳房有三個主要的組織：(1)腺體組織：每個乳房約有15-20個大葉，呈放射狀，匯集於乳頭，生產後乳汁由此分泌出來；(2)纖維組織：支持腺體組織；(3)脂肪：環繞於乳房四周。



乳癌可能由不同的乳房細胞發展而成，最常見的為乳管癌與乳葉癌。

每一乳葉包含許多小葉，而乳葉以及小葉之間由許多細管相連接，這些乳腺管細胞不正常增生而形成的癌稱為乳管癌。

由乳葉產生的叫作乳葉癌，乳葉癌是多發性，會在單側或雙側乳房多處增生。至於發炎性乳癌較不常見，臨床常呈現乳房紅腫、發熱的現象。

乳癌有那些主要症狀？

常見的症狀有：(1)無痛性乳房腫塊；(2)乳頭凹陷；(3)乳頭異樣分泌物，尤其是帶血分泌物；(4)乳房外型改變，局部凹陷或凸出；(5)乳房皮膚有橘皮樣變化，甚至紅腫或潰爛；(6)無痛性腋下淋巴腫大。若有上述任一現象應求助一般外科醫師，外科醫師會做乳房觸診或安排乳房超音波、乳房攝影。若高度懷疑惡性腫瘤時，則安排針吸或切片檢查，以確定是否為癌細胞。

台灣乳癌現況

國民健康署於2014年4月15日最新公布2011年國人女性乳癌人數首度突破萬人大關，比2010年增加401人，增加的比率為4.2%。

國外研究顯示，50歲以上婦女每2-3年接受一次乳房攝影篩檢可早期發現乳癌，而45-49歲婦女為我國罹患乳癌的高峰，因此國民健康署提供45-69歲婦女、40-44歲婦女以及二等親內具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女，每兩年一次免費乳癌篩檢服務。

2011年 女性乳癌人數	2010年 女性乳癌人數	年度 增加人數	年度 增加比例
10056	9655	401	4.2%

乳房攝影的結果報告

檢查結果	後續處理
0	乳房有變化，需要其他影像輔助檢查以確定診斷
1	無異常發現，建議定期檢查
2	乳房有良性變化，尚不需作任何處置，建議定期檢查
3	乳房有變化但疑似良性，建議短期內進行追蹤檢查
4	乳房有異常變化疑似惡性，需考慮進一步作穿刺生檢或病理組織切片
5	乳房有異常變化及可能是惡性腫瘤，需採取適當行動，如手術或切片檢查

※ 提醒您：檢查結果為0、4、5，應儘速回診，接受進一步檢查。

國民健康署提供台灣乳癌存活率如下：

乳癌分期	5年存活率
第0期	91~98%
第1期	90~96%
第2期	84~89%
第3期	55~67%
第4期	18~38%

乳癌的治療方式



乳癌如何治療？

乳癌的治療方法有局部或全身性的。局部治療是用來移除、消滅或控制特定部位的腫瘤，手術和放射線治療是屬於局部治療；全身性治療是用來消滅或控制身體任何地方的癌細胞，化學治療及荷爾蒙治療、標靶治療便屬於全身性治療。醫師會根據各項檢查以及期別，而有不同的治療組合。乳癌的治療有下列五種常見的方式，患者可能只接受一種的治療或組合式的治療，不同種類的治療，可能同時給予，或是一種接著一種地給予。

(1)手術切除：外科手術是治療乳癌最主要的方法，目前常見的手術有下列幾種：

- 改良型乳房根除手術
- 乳房保留手術
- 單純性全乳房切除手術
- 部分乳房組織切除術

以上可再配合腋下淋巴廓清術或前哨淋巴摘除術，手術的方式會因不同的狀況有不同的處理方式，乳房外科醫師會根據患者的臨床期別，詳細地解釋可能採取的手術方式，討論優點及可能傷害。

(2)放射線治療：利用直線加速器產生高能量的電子放射

線殺死癌細胞。

(3)荷爾蒙療法：利用藥物或外科方式（摘除卵巢），降低身體中雌性激素的生成，來抑制癌細胞生長，此種療法適用於腫瘤細胞具有荷爾蒙接受器(包括動情素受體ER或黃體素受體PR)為陽性者。

(4)化學治療：利用口服或注射藥物殺死或抑制癌細胞。

(5)標靶治療：乳癌之標靶治療藥物，可分為兩大類，分別為單株抗體與小分子藥品，主要是阻礙癌細胞的形成及減少轉移。因為這些藥品皆為較新的產品，部分藥品健保尚未給付。

A. 單株抗體

a) Ado-trastuzumab emtansine (商品名：
Kadcyla 賀癌寧)

Kadcyla是一個單株抗體與傳統化學治療的組合藥品。其中的單株抗體就是賀癌平的成分，而傳統化學治療是一個可以阻礙癌細胞分裂生長的藥品。單株抗體可以引導這個傳統化學治療藥品，精確地找到表面具有生長因子受體第二型蛋白過度表現的乳癌細胞。目前主要使用在紫杉醇類藥品與賀癌平治療後復發的病人。

b) Bevacizumab (商品名：癌思停)

癌思停與賀癌平一樣都屬於單株抗體，但是癌思停與賀癌平的作用方式完全不一樣。癌細胞常常在生長中需要額外的血液供應，因此分泌血管內皮生長因子來形成新的血管，這個作用被稱為血管新生。癌思停可以降

低癌細胞引起的血管新生作用，而使得癌細胞的生長與轉移受到抑制。通常必須與傳統化學治療藥品一同併用達到治療效果。

c) Pertuzumab (商品名：賀疾妥)

賀疾妥與賀癌平一樣也是第二型人類上皮細胞生長因子受體單株抗體，可以避免人類上皮細胞生長因子受體兩兩結合所造成癌細胞生長訊號的傳導。因此賀疾妥與賀癌平合併使用在賀癌平治療失敗病人時，疾病控制率可提升到41.2%，無惡化存活期亦明顯獲得改善。

d) Trastuzumab (商品名：賀癌平)

研究得知，乳癌細胞表面具有人類上皮細胞生長因子受體家族，此受體家族可分為第一型至第四型。其中第二型人類上皮細胞生長因子受體(HER-2/neu)基因複製數目的增加，可導致癌細胞表面第二型人類上皮細胞生長因子接受體蛋白的表現增加，從而使細胞生長訊息傳遞增加，導致細胞增生速度加快，同時影響腫瘤生長與擴散的能力，也會影響腫瘤對治療的反應。賀癌平可以阻擾癌細胞上的表皮生長因子受體之生長訊息傳遞，進而抑制乳癌細胞的生長與擴散。

B. 小分子藥物

a) Everolimus (商品名：癌伏妥)

癌伏妥與芳香環酶抑制劑諾曼癌素(Aromasin)合併使用在停經後轉移性荷爾蒙接受體陽性乳癌病人且

已對其他芳香環酶抑制劑復乳納(Femara)或安美達(Arimidex)治療無效時，可使疾病無惡化存活期由3.2個月(單獨使用諾曼癌素)延長一倍以上而達到7.4個月；疾病控制率也由25.5%增加到50.5%。

b) Lapatinib (商品名：泰嘉錠)

泰嘉錠作用方式是抑制人類表皮生長因子受體在細胞內的酪胺酸激酶(tyrosine kinase)，如此可抑制癌細胞的訊息傳遞而達到治療效果。這是一個口服藥品，可以單獨使用或與化學藥品合併使用皆有療效。目前的治療角色主要用於治療使用過賀癌平而復發的轉移性乳癌。





荷爾蒙治療藥物 I

學名 **Anastrozole**

商品名 (用法：口服)

Arimidex (安美達)

Anazo (安納柔)

Ansuzole (安斯如)

注意事項

- 服藥期間若出現胸痛、呼吸急促、腳或小腿腫痛、骨頭痛、眼白或皮膚變黃等症狀時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生背痛、肌肉痛、臉紅熱、身體發熱，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，妳可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 停經後婦女才可以使用。
- 需長期服用才能得到最好的治療效果，因此千萬不可因病情好轉而自行停藥。
- 本藥品可空腹服用，也可與食物同時服用。
- 長期服用可能降低骨質密度，藥物開始使用前已經有骨質疏鬆症者，請告知醫師或藥師。



荷爾蒙治療藥物 II

學名 **Exemestane**

商品名 (用法：口服)

Aromasin (諾曼癌素)

注意事項

- 服藥期間若出現胸痛、呼吸急促、腳或小腿腫痛症狀時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生背痛、肌肉痛、骨頭痛、臉紅熱、身體發熱、食慾增加，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，妳可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 停經後婦女才可以使用。
- 需長期服用才能得到最好的治療效果，因此千萬不可因病情好轉而自行停藥。
- 本藥品須飯後一小時內服用。
- 若妳正在或準備開始服用抗結核病藥rifampin、抗癲癇藥、聖約翰草，請務必告知醫師或藥師。
- 長期服用可能降低骨質密度，藥物開始使用前已經有骨質疏鬆症者，請告知醫師或藥師。



荷爾蒙治療藥物 III

學名 **Fulvestrant**

商品名 (用法：肌肉注射，每個月注射一次)

Faslodex (法洛德)

注意事項

- 當出現身體水腫、體重明顯增加、手腳有刺痛感症狀、胸痛或呼吸困難、發燒、發冷、喉嚨痛、咳嗽時要立刻告知醫師或藥師。
- 使用本藥品可能會產生背痛、骨頭痛、肌肉痛、臉紅熱、身體發熱、皮膚感覺異常、陰道出血、噁心、嘔吐，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，你可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 停經後婦女才可以使用。
- 若你正在或準備開始服用抗凝血藥warfarin，請務必告知醫師或藥師。



荷爾蒙治療藥物 IV

學名 **Goserelin**

商品名 (用法：皮下注射，每28天注射一次)

Zoladex (諾雷德)

注意事項

- 當出現心跳加快或不規則、呼吸困難、血壓明顯下降症狀時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生臉紅熱、身體發熱、月經不規則等類似停經的症狀。這些症狀可自行或經處置後得到緩解，你可詢問醫師或藥師。
- 注射部位，可能有疼痛、發癢、灼熱、腫脹的症狀。這是正常的反應。

衷心的叮嚀

- 若你正在或準備開始服用荷爾蒙藥物、類固醇、抗癲癇藥，請務必告知醫師或藥師。
- 在開始服藥前或服藥期間，若您懷疑已經懷孕，請立即告訴醫師。
- 長期服用可能降低骨質密度，藥物開始使用前已經有骨質疏鬆症者，請告知醫師或藥師。



荷爾蒙治療藥物 V

學名 **Letrozole**

商品名 (用法：口服)

Femara (復乳納)

注意事項

1. 服藥期間若出現胸痛、呼吸急促、腳或小腿腫痛症狀時要立刻聯絡醫師。
2. 使用本藥品可能會產生背痛、肌肉痛、骨頭痛、臉紅熱、身體發熱，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 停經後婦女才可以使用。
2. 需長期服用才能得到最好的治療效果，因此千萬不可因病情好轉而自行停藥。
3. 本藥品可空腹服用，也可與食物同時服用。
4. 長期服用可能降低骨質密度，藥物開始使用前已經有骨質疏鬆症者，請告知醫師或藥師。
5. 可能引起暈眩，當進行需要注意力之行為時，需要謹慎。最好避免開車或操作機械等有危險的行為。

荷爾蒙治療藥物 VI

學名 **Megestrol**

商品名 (用法：口服)

Megace (滅惡速)

Megejohn (美雅祥)

Mekei (美客怡)

Mestrol (美斯諾)

Megaplex (美格普)



注意事項

1. 服藥期間若出現頭痛、胸痛、四肢疼痛、呼吸急促、說話含糊不清、視力變差症狀時要立刻聯絡醫師。
2. 使用本藥品可能會產生眩暉、噁心或嘔吐、疲倦感、月經週期及經血量改變、水腫、體重增加，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，妳可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 需長期服用才能得到最好的治療效果，因此千萬不可因病情好轉而自行停藥。
2. 本藥品隨餐或空腹服用皆可。



荷爾蒙治療藥物 VII

學名 **Tamoxifen**

商品名 (用法：口服)

Genox (克爾癌) Tamofen (泰慕菲)

Novofen (諾普惠) Tamoplex (體得適)

Nolvadex (諾瓦得士) Taxifen (癌喜芬)

Tadex (得適)

注意事項

1. 服藥期間若出現小腿腫痛、呼吸困難、手腳無力、意識改變、胸痛、月經異常出血、骨盆脹痛、視力變差、
2. 咳血症狀、深茶色尿液、灰白色糞便或懷疑懷孕時要立刻聯絡醫師。

使用本藥品可能會產生月經不規則、臉紅熱、身體發熱，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，妳可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 需長期服用才能得到最好的治療效果，因此千萬不可因病情好轉而自行停藥。
2. 若妳正在服用抗凝血藥warfarin，必須告知醫師或藥師。
3. 本藥品可空腹服用，也可與食物同時服用。

4. 若妳正在或準備開始服用抗結核病藥rifampin、調適心情藥物，請務必告知醫師或藥師。

5. 長期服用期間請定期與婦產科醫師約診。



荷爾蒙治療藥物 VIII

學名 Toremifene

商品名 (用法：口服)

Fareston (弗瑞斯)

注意事項

1. 服藥期間若出現小腿腫痛、呼吸困難、手腳無力、意識改變、胸痛、月經異常出血、骨盆脹痛、視力變差、咳血症狀時要立刻聯絡醫師。
2. 使用本藥品可能會產生月經不規則、臉紅熱、身體發熱、眼睛乾燥，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 停經後婦女才可以使用。
2. 需長期服用才能得到最好的治療效果，因此千萬不可因病情好轉而自行停藥。
3. 本藥品可空腹服用，也可與食物同時服用。
4. 若妳正在或準備開始服用抗凝血藥warfarin、抗黴菌藥ketoconazole、利尿劑、抗癲癇藥、紅黴素，請務必告知醫師或藥師。

化療藥物



1. 紫杉醇家族 I

學名 Docetaxel

商品名 (用法：靜脈注射)

Taxotere (剝癌易) Tyxan (汰杉)

注意事項

1. 當出現發燒或發冷、喉嚨痛、黑便、血尿、小便疼痛或困難、皮膚上有出血點或瘀青、呼吸困難、全身起紅疹症狀、心跳快速或不規則、四肢皮膚感覺麻木或燒灼刺痛、臉或四肢浮腫、頭暈時要立刻告知醫師。
2. 使用本藥品可能會產生掉髮、腹瀉、噁心、嘔吐、口腔黏膜潰瘍、疲倦，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，妳可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 醫師會告訴妳在接受此藥物治療前需要使用類固醇，預防一些可能發生的副作用。
2. 若要施打疫苗需先和醫師討論。
3. 若妳正在服用免疫抑制劑cyclosporine、紅黴素、抗黴菌藥ketoconazole，請務必告知醫師或藥師。
4. 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98頁)。



化療藥物

1. 紫杉醇家族 II

學名 **Paclitaxel**

商品名 (用法：靜脈注射)

Anzatax (安素泰)	Paclitaxel (紫杉醇)
Genetaxyl (欣沛方)	Phyxol (輝克癒蘇)
Genaxol (淨癌順)	Pormoxol (伏摩素)
Intaxel (癌克平)	Taxol (汰癌勝)
Paclitaxin (搏克力)	Teva (帕特癌)

注意事項

- 當出現發燒或發冷、喉嚨痛、黑便、血尿、小便疼痛或困難、皮膚上有出血點或瘀青、呼吸困難、全身起紅疹症狀、心跳快速或不規則、四肢皮膚感覺麻木或燒灼刺痛、臉或四肢浮腫、頭暈時要立刻告知醫師。
- 使用本藥品可能會產生掉髮、腹瀉、噁心、嘔吐、口腔黏膜潰瘍、疲倦，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 若要施打疫苗需先和醫師討論。
- 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98頁)。



化療藥物

2. 小紅莓家族 I

學名 **Doxorubicin**

商品名 (用法：靜脈注射)

Adriblastina (艾黴素)	Doxor (利癌)
Doxorubicin DBL (德壽魯素)	Doxorubicin (阿雷素)

注意事項

- 當出現發燒或發冷、喉嚨痛、黑便、小便疼痛或困難、皮膚上有出血點或瘀青、呼吸困難、心跳快速或不規則、水腫、全身起紅疹症狀、嚴重的噁心嘔吐時，要立刻告知醫師或藥師。
- 使用本藥品可能會產生掉髮、腹瀉、噁心、嘔吐、停經、臉紅熱、身體發熱、口腔黏膜潰瘍，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 本藥品會使尿液顏色變紅一至二天，這是正常現象，所以不必驚慌。
- 記得多喝水。
- 若正在服用治療心臟疾病藥物，請務必告知醫師或藥師。
- 若要施打疫苗需先和醫師討論。

5. 注射部位有刺痛或灼熱感，立即告知醫護人員。
6. 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、脫髮、生殖機能改變，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98、101、103頁)。

化療藥物



2. 小紅莓家族 II

學名 **Liposomal Doxorubicin**

商品名 (用法：靜脈注射)

Caelyx (康利斯) Lipo-Dox (力得)

注意事項

1. 當出現發燒或發冷、喉嚨痛、黑便、小便疼痛或困難、皮膚上有出血點或瘀青、呼吸困難、心跳快速或不規則、水腫、全身起紅疹症狀、手或腳有皮膚脫皮或發紅或疼痛時，要立刻告知醫師或藥師。
2. 使用本藥品可能會產生掉髮、腹瀉、噁心、嘔吐、停經、臉紅熱、身體發熱、口腔黏膜潰瘍，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，你可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 本藥品會使尿液顏色變紅一至二天，這是正常現象，所以不必驚慌。
2. 記得多喝水。
3. 若你正在服用治療心臟疾病藥物，請務必告知醫師或藥師。
4. 若要施打疫苗需先和醫師討論。
5. 在輸注藥品當中，如果覺得背痛、臉部潮紅、呼吸急

促、頭痛、胸部或喉嚨有緊縮感，請立即通知醫護人員，有可能給藥速度太快或對藥物有不良反應。

6. 注射部位有刺痛或灼熱感，立即告知醫護人員。
7. 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、脫髮、生殖機能改變，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98、101、103頁)。

化療藥物



2. 小紅莓家族 III

學名 **Epirubicin**

商品名 (用法：靜脈注射)

Anthracin (癌療信)

Epirubicin (艾比魯素)

Epicin Lyo (克癌)

Panbicin (益必信)

Epicin (益彼欣)

Pharmorubicin (泛艾黴素)

注意事項

1. 當出現發燒或發冷、喉嚨痛、黑便、小便疼痛或困難、皮膚上有出血點或瘀青、呼吸困難、心跳快速或不規則、水腫、全身起紅疹症狀時要立刻告知醫師或藥師。
2. 使用本藥品可能會產生掉髮、腹瀉、噁心、嘔吐、停經、臉紅熱、身體發熱、口腔黏膜潰瘍，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，妳可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 本藥品會使尿液顏色變紅一至二天，這是正常現象，所以不必驚慌。
2. 記得多喝水。
3. 若妳正在服用治療心臟疾病藥物或腸胃藥cimetidine (Tagamet)，請務必告知醫師或藥師。

4. 若要施打疫苗需先和醫師討論。
5. 注射部位有刺痛或灼熱感，立即告知醫護人員。
6. 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、脫髮、生殖機能改變，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98、101、103頁)。

化療藥物



3. 氮芥子氣家族

學名 **Cyclophosphamide**

商品名 (用法：靜脈注射、口服)

Endoxan (癌德星) Syklofosfamid (塞克羅邁得)

注意事項

1. 當出現發燒或發冷、喉嚨痛、排尿疼痛或困難、血尿、下背痛症狀時要立刻告知醫師或藥師。
2. 使用本藥品可能會產生掉髮、皮膚顏色變深、沒有食慾、腹瀉、噁心、嘔吐、口腔黏膜潰瘍，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，妳可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 記得多喝水以及不要憋尿。
2. 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、手足症候群、脫髮、生殖機能改變，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98、104、101、103頁)。
3. 口服藥品和食物同時服用可減輕胃部不適。



化療藥物

4. 抗代謝家族 I

學名 Fluorouracil

商品名 (用法：靜脈注射)

Fluorouracil (服樂癌)

Fluoro-Uracil (有利癌)

注意事項

- 當出現發燒或發冷、腹瀉、心灼熱感、胸痛、咳嗽或聲音沙啞、呼吸急促、下背痛、排尿困難或疼痛、血尿、黑便、不尋常出血或瘀青時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生掉髮、沒有食慾、噁心、嘔吐、口腔黏膜潰瘍、皮膚出現紅疹和搔癢、身體虛弱，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，妳可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 若要施打疫苗需先和醫師討論。
- 此藥物可能引起白血球下降、食慾不振、腹瀉、皮膚指甲色素沉澱、口腔黏膜損傷，請參考常見副作用處理(本書第92、98、99、102、97頁)。
- 若妳正在或準備開始服用抗凝血藥warfarin，請務必告知醫師或藥師。



化療藥物

4. 抗代謝家族 II

學名 Gemcitabine

商品名 (用法：靜脈注射)

Gemzar (健擇)

Gemmis (健仕)

Gemflor (雙福全)

Gemita (健彌達)

注意事項

- 當出現牙齦出血、血尿、血便、發燒或發冷、腹瀉、皮膚癢或燒灼刺痛感、咳嗽或聲音沙啞、呼吸困難、下背痛、排尿困難或疼痛、不尋常出血或瘀青、視力模糊、嚴重頭痛、手腳無力時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生掉髮、便秘、噁心、嘔吐、嗜睡，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，妳可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 若要施打疫苗需先和醫師討論。
- 此藥物可能引起白血球與血小板下降、食慾不振等，請參考常見副作用處理(本書第92、93、98頁)。



化療藥物

4. 抗代謝家族 III

學名 **Methotrexate**

商品名 (用法：靜脈注射)

Abitrexate (必除癌) Emthexate PF (易滅得庇福)

Methotrexate DBL (盈壽求得)

Methotrexate LEDERLE (滅殺除礙)

注意事項

- 當出現黑便、血尿、異常出血或瘀青、發燒或發冷、喉嚨痛、視力模糊、精神恍惚、痙攣、呼吸急促症狀時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生掉髮、沒有食慾、腹瀉、噁心、嘔吐、口腔黏膜潰瘍，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，你可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 若你正在或準備開始使用抗生素(盤尼西林、四環素、磺胺類抗生素)、維他命(含有葉酸)、葉酸、阿斯匹靈、抗癲癇藥phenytoin、治療肺部疾病藥物theophylline或aminophylline，請務必告知醫師或藥師。
- 若你有關節炎並正在用藥，請務必告知醫師或藥師。
- 若要施打疫苗需先和醫師討論。

4. 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、口腔黏膜損傷、生殖機能改變，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98、97、103頁)。



化療藥物

5. 白金家族 I

學名 **Cisplatin**

商品名 (用法：靜脈注射)

Abiplatin (阿樂癌)

Platinex (鉑帝爾)

Kemoplat (克莫抗癌)

Platamine (鉑特敏)

注意事項

- 當出現黑便、血便、血尿、身上出現異常出血點或瘀傷、發燒或發冷、心跳加快、臉腫、呼吸困難、耳鳴、走路不穩、手腳麻木或刺痛、下肢水腫、異常疲倦或虛弱時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生嚴重的噁心、嘔吐、沒有食慾，這些症狀可能延續到給藥後5-7天，有藥物可以有效地預防，你可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 若你正在或開始服用抗癲癇藥，請務必告知醫師或藥師。
- 記得多喝水。
- 注射部位有刺痛或灼熱感，立即告知醫護人員。
- 此藥物可能影響腎臟功能，若有排尿量明顯的變化，請通知醫師。

- 此藥物可能引起噁心嘔吐、食慾不振，請參考常見副作用處理(本書第96、98頁)。



化療藥物

5. 白金家族 II

學名 **Carboplatin**

商品名 (用法：靜脈注射)

Paraplatin (佳鉑帝)

注意事項

- 當出現黑便、血便、血尿、身上出現異常出血點或瘀傷、發燒或發冷、心跳加快、異常疲倦或虛弱時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生噁心、嘔吐、沒有食慾，這些症狀可能延續到給藥後5-7天，有藥物可以有效地預防，請詢問醫師或藥師。
- 可能在多次給藥後引起過敏反應，或過去曾經接受過其他含鉑藥品的治療，也可能在累積多次給藥後引起過敏反應。發生的時間通常在給藥後一小時內，若有發疹、發癢、甚至氣管收縮呼吸困難等過敏症狀出現時，立即通知醫護人員。

衷心的叮嚀

- 若正在或開始服用抗癲癇藥，請務必告知醫師或藥師。
- 手腳末端神經麻木不常見，但是年齡65歲以上與過去使用含鉑藥品者，發生機率會增加。

- 此藥物可能影響腎臟功能，若有排尿量明顯的變化，請通知醫師。
- 此藥物可能引起噁心嘔吐、食慾不振，請參考常見副作用處理 (本書第96、98頁)。



化療藥物

6. 長春花家族

學名 Vinorelbine

商品名 (用法：靜脈注射)

Navelbine (溫諾平)

Vinorelbine (必諾賓)

注意事項

- 當出現發燒或發冷、腹瀉或進食後腹痛、心灼熱感、胸痛、咳嗽或聲音沙啞、呼吸急促、下背痛、排尿排便困難或疼痛、血尿、黑便、不尋常出血或瘀青時，要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生便秘、沒有食慾、腹瀉、噁心、嘔吐、關節或肌肉痛、下巴疼痛，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，你可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 此藥物可能引起白血球下降、脫髮、便秘、噁心嘔吐，請參考常見副作用處理(本書第92、101、100、96頁)。
- 若注射部位有刺痛或灼熱感，立即告知醫護人員。



化療藥物

7. 小藍莓家族

學名 Mitoxantrone

商品名 (用法：靜脈注射)

Mitoxantrone (雙羥蒽醌) Novantrone (能滅瘤)

注意事項

- 當出現呼吸急促、心跳加快或不規則、發燒或發冷、下背痛、排尿困難或疼痛、血尿、黑便、不尋常出血或瘀青、快速地增加體重或手腳水腫時，要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生便秘、腹瀉、噁心、嘔吐、身體疼痛、頭痛、掉髮、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、月經不規則，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，你可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 本藥品會使尿液顏色變為藍綠色以及眼白部位變為藍色，這是正常現象，會持續一至二天，所以不必驚慌。
- 若要施打疫苗需先和醫師討論。
- 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、脫髮、生殖機能改變，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98、101、103頁)。
- 若注射部位有刺痛或灼熱感，立即告知醫護人員。



化療藥物

8. 其它口服藥品 I

學名 **Capecitabine**

商品名 (用法：口服)

Xeloda (截瘤達)

注意事項

- 當出現一天腹瀉超過四次、噁心吃不下飯、手掌或腳底起水泡或發紅腫痛已影響到日常生活、一天嘔吐超過兩次、口腔黏膜或嘴唇潰瘍已影響到進食時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生便秘、沒有食慾、皮膚癢或異常感，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，妳可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 本藥品應和食物同時服用或飯後半小時內服藥；每一次服藥時，通常會服用超過一顆藥錠，必須拿對的規格來組合對的劑量。
- 若妳正在或準備開始服用抗癲癇藥phenytoin、葉酸製劑folic acid或leucovorin、抗凝血藥warfarin、胃藥，請務必告知醫師或藥師。
- 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、皮膚指甲色素沉澱、口腔黏膜損傷、手足症候群，請

參考常見副作用處理(本書第92、96、98、102、97、104頁)。

- 若有嚴重的腎臟疾病，應避免使用此藥。



化療藥物

8. 其它口服藥品 II

學名 **Tegafur**

商品名 (用法：口服)

Flacil (福特喜)

Futraful (富多拉富)

注意事項

- 當出現發燒或發冷、腹瀉、胸痛、咳嗽或聲音沙啞、呼吸急促、下背痛、排尿困難或疼痛、血尿、黑便、不尋常出血或瘀青時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生掉髮、沒有食慾、噁心、嘔吐、口腔黏膜潰瘍、皮膚出現紅疹和搔癢、身體虛弱，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、皮膚指甲色素沉澱、口腔黏膜損傷、手足症候群，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98、102、97、104頁)。



化療藥物

8. 其它口服藥品 III

學名 **Tegafur / Uracil**

商品名 (用法：口服)

Furil (復癒)

UFUR (友復)

注意事項

- 當出現發燒或發冷、腹瀉、胸痛、咳嗽或聲音沙啞、呼吸急促、下背痛、排尿困難或疼痛、血尿、黑便、不尋常出血或瘀青時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生掉髮、沒有食慾、噁心、嘔吐、口腔黏膜潰瘍、皮膚出現紅疹和搔癢、身體虛弱，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，你可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、皮膚指甲色素沉澱、口腔黏膜損傷、手足症候群，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98、102、97、104頁)。



化療藥物

8. 其它口服藥品 IV

學名 Vinorelbine

商品名 (用法：口服)

Navelbine (溫諾平)

注意事項

- 當出現發燒或發冷、腹瀉、心灼熱感、胸痛、咳嗽或聲音沙啞、呼吸急促、下背痛、排尿困難或疼痛、血尿、黑便、不尋常出血或瘀青時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生便秘、沒有食慾、腹瀉、噁心、嘔吐、關節或肌肉痛、下巴疼痛，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，你可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 本藥品必須在用餐時以水整顆吞服(不可咬破)。
- 本藥品儲存溫度必須在2-8 °C(即冰箱下層)，不可冷凍。
- 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、口腔黏膜損傷。請參考常見副作用處理(本書第92、96、98、97頁)。

標靶藥物 I



學名 Ado-trastuzumab emtansine

商品名 (用法：靜脈注射)

Kadcyla (賀癌寧)

注意事項

- 當出現以下症狀要立刻聯絡醫師：
 - 感染徵兆(發燒或發冷、喉嚨痛、耳痛或有分泌物、痰量增加或顏色改變、排尿疼痛、傷口不癒合)。
 - 藥物過敏現象(紅疹、皮膚癢、呼吸困難、喉嚨或胸部緊縮、嘴唇或舌頭腫大、臉腫)。
 - 肝功能變化(異常疲倦、食慾降低、小便顏色變深、皮膚變黃)。
 - 胸痛或有壓迫感、心跳快速、進行日常活動就出現呼吸急促。
 - 嚴重腹部不適、體重快速增加、下肢水腫時。
 - 血小板低下的症狀，(例如身上出現針狀血點、瘀青、流鼻血、血尿)。
- 使用本藥品可能會產生口乾、發燒、無法入睡、咳嗽、覺得疲倦或虛弱、頭痛、腹部不適、腹瀉、便秘、噁心、骨頭與肌肉疼痛，這些症狀可自行或經處置後得

到緩解，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 若已懷孕或計畫懷孕，請務必告知醫師或藥師。使用本藥品期間須使用避孕措施，若在治療當中發覺懷孕，請立即通知醫師，哺乳可能會對嬰兒造成傷害。
2. 在注射過程中有任何不適，要立刻告知護士或醫師。

標靶藥物 II



學名 **Bevacizumab**

商品名 (用法：靜脈注射)

Avastin (癌思停)

注意事項

1. 當出現以下症狀請立即與您的醫師聯絡：
 - a. 皮膚癢或紅疹、臉或嘴唇腫脹。
 - b. 喉嚨或胸部有緊縮感、呼吸困難、胸痛。
 - c. 發燒或發冷、喉嚨痛、排尿困難或疼痛。
 - d. 異常出血（流鼻血、血尿、解黑便、陰道出血、咳血）。
 - e. 異常腹痛或背痛。
 - f. 視覺改變、突然劇烈頭痛、意識混亂、抽搐、走路不穩、手腳無力。
2. 使用本藥品可能會產生血壓上升、蛋白尿、疲倦、味覺改變、口乾、食慾不振、噁心、掉髮，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，若有進一步的問題，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 輸注藥物時，若出現發燒或發冷、紅疹、搔癢、呼吸困難、胸痛、頭暈時，請立即通知醫護人員。
2. 使用本藥品會影響傷口的癒合，因此若要進行牙科處置或是任何手術前，請務必告知執行處置或手術的醫師，正在使用本藥品。
3. 此藥物可能引起高血壓、蛋白尿、出血及傷口癒合問題。

標靶藥物 III



學名 **Everolimus**

商品名 (用法：口服)

Afinitor (癌伏妥)

注意事項

1. 最常見的副作用是口腔黏膜炎、感染、皮膚疹、疲倦、腹瀉、水腫、腹痛等。醫師可以依照以上副作用的嚴重程度來調整藥品劑量。
2. 可能影響肝功能腎功能，醫師將定期追蹤您的肝腎功能指數並且調整劑量。
3. 可能影響血糖、血脂肪的代謝，醫師將定期追蹤；若原本就有糖尿病或高膽固醇、高三酸甘油酯，應注意是否需要調整降血糖藥與降血脂藥品的劑量。
4. 因為藥品可能造成畸胎，服藥期間至停藥後八週內必須避免懷孕。

衷心的叮嚀

1. 藥品本身有抑制免疫力的作用，所以可能有較高的可能性得到感染，因此如果有感染症狀請立即與醫師聯絡。
2. 可能引起非感染性肺炎，如果胸痛、呼吸不順暢等須立即與醫師聯絡。

- 無論空腹或隨餐皆可，建議選擇固定在空腹或隨餐時服藥。
- 在接受疫苗接種前，需先和醫師討論。
- 請告訴醫師或藥師目前正在服用的任何藥品，包括處方藥、成藥、保健食品等，以利進行藥品交互作用評估。開始服用此藥以後，若要開始服用新的藥品，也請告知醫師或藥師。

標靶藥物 IV



學名 Pertuzumab

商品名 (用法：靜脈注射)

Perjeta (賀疾妥)

注意事項

- 當出現感染徵兆(發燒或發冷、喉嚨痛、耳痛或有分泌物、咳嗽有痰、排尿疼痛或有燒灼感)、藥物過敏現象(紅疹、皮膚癢、呼吸困難、喉嚨或胸部緊縮、嘴唇或舌頭腫大、臉腫)、胸痛或有壓迫感、心跳快速、進行日常活動就出現呼吸急促、劇烈頭痛、嚴重頭暈、嚴重腹瀉、極度疲倦或虛弱、嚴重腹部不適或嘔吐、體重快速增加、下肢水腫時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生掉頭髮、疲倦、頭暈、頭痛、腹部不適、腹瀉、沒有食慾、噁心、嘔吐，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 若已懷孕或計畫懷孕，請務必告知醫師或藥師。使用本藥品期間須使用避孕措施，若在治療當中發覺懷孕，請立即通知醫師。
- 在注射過程中有任何不適，要立刻告知護士或醫師。



標靶藥物 V

學名 **Lapatinib**

商品名 (用法：口服)

Tykerb (泰嘉錠)

注意事項

- 當出現皮膚紅疹或搔癢、呼吸困難、胸悶、嘴唇或舌頭腫大、嚴重腹瀉、心跳異常快速、發燒、極度疲倦或虛弱時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生腹瀉、噁心、嘔吐、食慾不佳、手腳發紅或疼痛、睡眠障礙，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 若正在或準備開始服用抗生素、抗黴菌藥、降血壓藥、抗癲癇藥、調適心情藥物、治療愛滋病藥物、類固醇、聖約翰草，請務必告知醫師或藥師。
- 服藥期間不要吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。
- 空腹服藥 (飯前至少一小時或飯後至少兩小時)。



標靶藥物 VI

學名 **Trastuzumab**

商品名 (用法：靜脈注射)

Herceptin (賀癌平)

注意事項

- 當出現皮膚紅疹或搔癢、呼吸困難、胸悶、嘴唇或舌頭腫大、下肢水腫、心跳異常快速、發燒、極度疲倦或虛弱時要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、食慾不佳、頭痛、肌肉痛、睡眠障礙，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

- 在注射過程中有任何不適，要立刻告知護士或醫師。
- 若曾經發生打針過敏事件，務必先告知醫師或藥師。



4 乳癌輔助性化學治療

(Adjuvant Chemotherapy of Breast Cancer)

A. 不含「賀癌平」化學治療組合配方

藥物	參閱頁數
AC (Doxorubicin/Cyclophosphamide)	P37, P43
AC->T(Doxorubicin/Cyclophosphamide,followed by paclitaxel)	P37, P43, P36
CMF (Cyclophosphamide/Methotrexate/Fluorouracil)	P43, P46, P44
FAC/CAF (Fluorouracil/Doxorubicin/Cyclophosphamide)	P44, P37, P43
FEC/CEF (Fluorouracil/Epirubicin/Cyclophosphamide)	P44, P41, P43
FEC->T (Fluorouracil/Epirubicin/Cyclophosphamide, followed by Docetaxel)	P44, P41, P43, P35
TAC (Docetaxel/Doxorubicin/Cyclophosphamide)	P35, P37, P43

B. 含「賀癌平」化學治療組合配方

藥物	參閱頁數
AC->TH(Doxorubicin/Cyclophosphamide, followed by Docetaxel/Trastuzumab)	P37, P43, P35, P23
TCH(Docetaxel/Carboplatin或Cisplatin/Trastuzumab)	P35, P48, P23, p50



其他藥物

A、止吐藥物 I

學名 **Aprepitant**

商品名 (用法：口服)

Emend (止敏吐)

學名 **Fosaprepitant**

商品名 (用法：注射)

Emend (止敏吐)

注意事項

- 若服藥期間出現過敏症狀、呼吸或吞嚥困難、身體浮腫，應立刻停藥並就醫。
- 使用本藥品可能會有疲倦、暈眩、腹瀉或便秘、打嗝、噁心、食慾降低、口乾的副作用。

衷心的叮嚀

- 本藥品可能與多種藥品產生交互作用，請告知醫師或藥師正在服用的藥品（包括中草藥及維他命）。
- 本藥品會減低口服避孕藥的效果，服用本藥期間應使用其他輔助避孕措施。
- 若忘記用藥，想起時應立即服藥；但若已接近下一次服藥時間，則只需服用下一次劑量，切勿同時服用雙倍劑量。



其他藥物

A. 止吐藥物 II

學名 **Dexamethasone**

商品名 (用法：口服或注射)

Carolin (佳洛菱)	Dexamethasone (力及美壯)
Deca (得佳、力克)	Dexan (力達爽)
Decadalin (利康能)	Decanon, Dexaroid (立克能)
Decadolone (力加多倫)	Dexaroid (立克能)
Decadron (的確當)	Dexaron (力克樂、特塞隆)
Decalin (得克寧)	Dexasone (得舒爽、得立速片)
Decalon (得嘉能、得卡隆、得卡多寧)	Dexasone (特康舒片、力加通片) Dexasolen (得確素寧片)
Decamin (禮康明)	Dexatone (利康多能)
Decan (特佳)	Dexazone (克儂強片)
Decans (得卡舒)	Dexthamycin (德速神)
Decarone (雷克送)	Dexon (帝爽)
Decason (得可爽片)	Dexsone (里克壯)
Decasone (力加生)	Dica (敵他)
Decatolon (立可特寧)	Dicosheun (利可順)
Decon (炎必寧)	Dorison (得立生)
Decone (得康)	Ercazon (怡佳爽)
Decoron (得克隆、特卡朗)	Hi-Methasone (高美塞鬆)
Decoton (特克通)	Kovin Tong (過敏當)
Decotong (得刻通)	Medesone (美得松)
Dekesu (特可舒)	Methasone (敏速平、美塞鬆)
Demeson (立每順)	Mexaton (美撒松)
Dorison (得立生)	Mid-Methasone (中美塞鬆)
Deson (得爽)	Neosolon (力速爽)
Dexadon (得刪痛)	Nugachenin (汝加確寧)

Dexadon(Dexadon-P注射劑) Oradexon (歐樂得爽)
Dexadrol(利加得隆) Ronpiline (統必林)
Decadolone (利加得隆) Selftison (自體松)
Dexamethasone (德善滅沙松、的剎美剎松、的格美利松、的確美他爽片、敵掃風濕片、力佳爽、力速爽、力克爽、力克能、力確多寧、利解痛、立爽朗、得加、得爽、得卡、得刻當、得刻朗、得可爽、得能速、得散鬆、得速爽、得美松、得美斯爽、治加鬆、特體松、得卡散)

注意事項

- 服藥期間若出現過敏、意識或行為改變、肌肉無力、水腫、嚴重胃痛或解黑便，要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會有腸胃不適、食慾增加、心情或意識改變、皮膚傷口癒合較慢等副作用。

衷心的叮嚀

- 長期連續使用可能造成免疫力降低、易感染、視力模糊、骨質疏鬆、體重增加、青春痘。若要施打疫苗需先和醫師討論。
- 若忘記用藥，想起時，應立即服藥；但若已接近下一次服藥時間，則只需服用下一次劑量，切勿同時服用雙倍劑量。



其他藥物

A. 止吐藥物 III

學名 Domperidone

商品名 (用法：口服)

Costi (可舒得)	Kantuu (抗吐)
Costine (可適)	Lidonin (利吐寧)
D. M. P. (通平)	Menton (免痛)
Daweison (達胃爽)	Motaline (莫吐)
Dercon (得爾康)	Moten (莫吐安)
Dompe (吐平)	Motin (莫痙)
Dompedon (吐必止)	Motou (莫吐)
Domper (吐福)	Mewellin (美胃寧)
Domperan (得朗)	Modone (莫吐)
Domperid (冬培力)	Molin (莫林)
Domperidone (納胃、吐安、 多普利杜)	Motilium (莫吐能)
Domten-CCPC (通坦)	Moturin (免吐寧)
Domtoo (除胃障)	Newedon (內胃朗)
Dotidone (樂治吐)	Nidoliun (吐寧)
Dosin (道喜)	Pelidone (吐寧)
Duoridone (胃利通)	Peptomet (培得)
Dompedon (吐必止)	Peridon (培胃通)
Emetrol (癒吐寧)	Rotilium (樂胃寧)
Foselin (腹舒寧)	Suweida (舒胃達)
Gain-Tonin (鎮吐寧)	Weitul (衛吐)
Genolin (鎮嘔能)	Wempty (胃利空)
	Wyeannin (胃益寧)

注意事項

- 雖然極少發生，但使用本藥品可能會有乳腺痛或非生理性分泌乳汁的副作用。若服藥期間出現過敏症狀、心跳變快或不規則、呼吸困難、肌肉痙攣或僵硬、不明原因高燒、盜汗、昏暈、走路不穩，應立刻停藥並就醫。

衷心的叮嚀

- 本藥品經過肝臟代謝，可能與多種藥品產生交互作用，請告知醫師或藥師正在服用的藥品，包括中草藥及維他命。
- 制酸劑或抗分泌藥品會影響胃腸吸收本藥品，不宜同時使用。
- 若患有肝病、腎病、腸道阻塞、胃腸出血、精神疾病或其他慢性疾病，使用本藥品前要告訴醫師。
- 若忘記用藥，想起時，應立即服藥；但若已接近下一次服藥時間，則只需服用下一次劑量，切勿同時服用雙倍劑量。



其他藥物

A. 止吐藥物 IV

學名 **Granisetron**

商品名 (用法：口服、注射、貼片)

Granisetron (康寧適從)

Kytron (欣克吐)

Grantron (康斯吐)

Otril (嘔停停)

Kyotil (適吐停)

Setron (賜安特)

Kytril (康您適強)

學名 **Ondansetron**

商品名 (用法：口服和注射)

Ondan (快平吐)

Vomiz (莫尼茲)

Onzod (安嘔)

Zofran (卓弗蘭)

Supren (蘇普瑞)

學名 **Palonosetron**

商品名 (用法：注射)

Aloxi (嘔立舒)

學名 **Ramosetron**

商品名 (用法：注射)

Setoral (適吐朗)

學名 **Tropisetron**

商品名 (用法：口服和注射)

Navoban (耐嘔伴)

注意事項

- 雖然極少發生，但若服藥期間出現過敏、嚴重肚子痛、肌肉抽動、眼球無法轉動、心跳過快過慢或不規則、胸痛的情形，要立刻聯絡醫師。
- 使用本藥品可能會產生頭痛、頭暈、便祕或腹瀉的副作用。

衷心的叮嚀

- 如果您本身肝功能不良或正在服用某些帕金森氏症藥物或心血管藥物，請記得告訴醫師。
- 若忘記用藥，想起時應立即服藥；但若已接近下一次服藥時間，則只需服用下一次劑量，切勿同時服用雙倍劑量。



其他藥物

A. 止吐藥物 V

學名 **Lorazepam**

商品名 (用法：口服)

Ativan (安定文)	Lorazin (樂力靜)
Anxicam (安心平)	Lorazon (泰靜)
Anxiedin (安靜)	Lorilsu (樂利舒錠)
Anzepam (安祈平)	Lorpip (樂平)
Atilen (安定寧)	Lovamin (安神)
Atipam (得定平)	Lowen (樂穩錠)
Atizepam (靜凡)	Neuropam (樂得靜、樂寧靜)
Fuletin (服能靜)	Padelin (派定寧)
Kolinin (可立寧、可立)	Silence (悠然)
Larpam (樂眠)	Spolin (施普寧)
Lopam (樂靜)	Stapam (速立安)
Lorat (樂拉特)	Wintin (溫鎮錠)
Lorapam (樂得平)	
Lorazepam (樂得靜、樂汝靜 、樂耐平、樂來寧、樂定平、樂 立舒平、欣怡、安樂寧)	

注意事項

1. 使用本藥品可能會有睏倦、頭痛、頭暈、口乾、便秘或腹瀉、視力模糊等副作用。
2. 當覺得非常頭暈目眩、意識不清、無力、心跳過慢、呼吸困難、走路不穩時，請立即就醫。

衷心的叮嚀

1. 本藥品會令人覺得睏倦，警覺性及動作協調能力降低，未確定本藥品的影響力之前，請勿開車或操作危險機械。此外，不可飲酒，盡量避免使用安眠藥、鎮靜劑、抗組織胺、麻醉止痛劑等，以免過度增強此藥品的鎮靜作用。
2. 若患有肝病、肺病、青光眼或正在服用其他藥品，使用本藥品前要告訴醫師。
3. 若忘記用藥，想起時應立即服藥；但若已接近下次服藥時間，則只需服用下一次劑量，切勿同時服用雙倍劑量。



其他藥物

A. 止吐藥物 VI

學名 **Metoclopramide**

商品名 (用法：口服和注射)

Aswell (安適胃寧)	Newfort (惠腹糖)
Balon (培朗)	Paspertase (拜胃爾)
Biwesan (必胃暢)	Perone (保瑞)
Chiaowelgen (佐胃健)	Primran (平朗、保胃朗)
Chitou (止吐錠)	Primerperan (腹寧朗)
Dikinex Repe (利康諾)	Priperim (普寧胃朗)
Dimotil Repe (立消樂)	Pripram (平派)
Dipertase (立消諾)	Podokedon (伯樂健朗)
Dringen (永胃健)	Poriran (迫利朗)
Eline (益林)	Pramin (普化)
Emelime (抗吐寧)	Prenperon (輔胃能)
Enteran (引得暢錠)	Prevomic (培嘔明)
Erweichalo (伊胃佳樂)	Prilan (普寧朗)
Esepacs (永舒百克胃)	Primlan (普寧朗)
Gastro-Timelets (胃斯妥持續膠囊)	Primitase (宜暢)
Gingsuwel (鎮舒胃)	Promeran (胃明朗、普克胃)
Horompelin (好樂寧)	Prometin (補樂美)
Imperan (英百朗)	Prowel (保胃)
Linwels (臨胃舒)	Pulin (普林)
Matolon (明特朗)	Pulinpelin (普寧培寧)
Maxolone (胃朗)	Pulperan (普爾倍朗)
Medewel (美得胃)	Putelome (補得樂美)
Meniperan (明林倍朗)	Pusuan (普舒安)
Mepram (美普朗)	Rowelcon (樂胃康)

Mepramide (每保胃)	Sinprim (杏胃特)
Methu (美舒)	Sinthato (星鎮吐)
Metoclopramide (美托拉麥、卜林朗、溫培朗、美吐克、別吐、普林倍朗、胃得朗)	Stomallin (司吐免) Suweilan (壽胃朗錠) Talex (腹消樂)
Metoco (美多克)	Torowilon (托樂胃朗)
Metomide (玫多邁)	Wei Lian (胃良)
Metopelan (胃百朗)	Weiskon (胃史康)
Metoperan (優腹、梅得柏朗、胃得倍朗)	Weiperan (胃必朗) Winperan (溫培朗)
Metopran (每得平)	Zudaw (滯導)
Mevaperan (美胃保朗)	

注意事項

- 使用本藥品可能會有睏倦、頭暈、便祕或腹瀉、頭痛、胸部脹痛等副作用。
- 雖然極少發生，但若服藥期間出現過敏症狀、心跳變快或不規則、呼吸困難、肌肉痙攣或僵硬、不明原因高燒、盜汗、昏暈、走路不穩、情緒改變（抑鬱），應立刻停藥並就醫。

衷心的叮嚀

- 本藥品會令人覺得睏倦、警覺性及動作協調能力降低，未確定本藥品的影響力之前，請勿開車或操作危險機械。此外，不可飲酒，盡量避免使用安眠藥、鎮靜劑、抗組織胺、麻醉止痛劑等，以免過度增強此藥品的鎮靜作用。
- 胃斯妥持續膠囊應整粒吞服；吞嚥困難者可打開膠囊

服用，但不可壓碎。

3. 若患有腎上腺瘤、癲癇、帕金森氏病、高血壓、糖尿病、肝病、腎病、心臟病、精神疾病、腸道阻塞、胃腸出血或其他慢性疾病，使用本藥品前要告訴醫師。
4. 若忘記用藥，想起時，應立即服藥；但若已接近下一次服藥時間，則只需服用下一次劑量，切勿同時服用雙倍劑量。

其他藥物



A、止吐藥物 VII

學名 **Mosapride**

商品名 (用法：口服)

Mopride (摩舒胃清) Mosapride (莫舒博德、莫沙普萊得)

注意事項

1. 使用本藥品可能會有腹瀉、頭痛等情形。
2. 雖然極少發生，但若服藥期間出現心悸、黃疸，或持續腹瀉、頭痛、口渴、噁心、嘔吐、倦怠感且症狀加重，應立刻告訴醫師。

衷心的叮嚀

1. 本藥品經過肝臟代謝，可能與多種藥品產生交互作用，請告知醫師或藥師正在服用的藥品（包括中草藥及維他命）。
2. 若患有心臟病、肝病、腎病、腸道阻塞、胃腸出血或其他慢性疾病，使用本藥品前要告訴醫師。
3. 若忘記用藥，想起時，應立即服藥；但若已接近下一次服藥時間，則只需服用下一次劑量，切勿同時服用雙倍劑量。



其他藥物

A. 止吐藥物 VIII

學名 **Prochlorperazine**

商品名 (用法：口服和注射)

Daolin (達噁寧)

Lotamin (安可寧)

Mormal (諾敏)

Novamin (諾安命)

Novomit (抑噁敏)

Ponpai (澎湃)

Proazine (頗安靜)

Prochlorperazine (普洛陪拉辛、

普樂明、縮蘋酸普氯苯塞、蘋果酸

丙氯陪拉辛、縮水蘋果酸丙氯倍拉

辛)

Prochlozine (保可寧)

Roumin (洛嘔寧)

Volimin (好立明)

注意事項

1. 使用本藥品可能會有睏倦、頭暈、口乾、便秘、視力模糊的副作用。
2. 雖然極少發生，但若服藥期間出現過敏症狀、心跳或呼吸急促、排尿困難、肌肉痙攣或僵硬、不明原因高燒，應立刻停藥並就醫。

衷心的叮嚀

1. 本藥品會令人覺得睏倦，警覺性及動作協調能力降低，未確定本藥品的影響力之前，請勿開車或操作危險機械。此外，不可飲酒，盡量避免使用安眠藥、鎮靜劑、抗組織胺、麻醉止痛劑等，以免過度增強此藥品的鎮靜作用。改變姿勢時動作也要放慢。

2. 制酸劑會影響胃腸吸收本藥品，不應同時使用。
3. 若患有癲癇、肝病、肺病、心臟病、青光眼或其他慢性疾病，使用本藥品前要告訴醫師。
4. 本藥會增加皮膚對陽光的敏感性，外出需做好防曬措施。
5. 若忘記用藥，想起時，應立即服藥；但若已接近下一次服藥時間，則只需服用下一次劑量，切勿同時服用雙倍劑量。



其他藥物

B. 預防或治療因骨轉移引起的骨折、
骨頭疼痛和血鈣上升

(一)、雙磷酸鹽類：

學名 **Clodronate**

商品名 (用法：口服和注射)

Bonefos (骨復舒) Sinclote (杏骨樂)

學名 **Ibandronate**

商品名 (用法：注射)

Bonviva (骨得寧)

學名 **Pamidronate**

商品名 (用法：注射)

Aredia (雷狄亞) Pamidron (帕米卓)
Pamisol (裴米索) Pamidronate (貝福沛米卓)

學名 **Zoledronic Acid**

商品名 (用法：注射)

Aclasta (骨力強) Zometa (卓骨祿)
Bolnic (卓固尼)

注意事項

- 使用本藥品時，有可能出現骨頭及肌肉疼痛、類似感冒的症狀、頭痛、頭暈、噁心、腹痛、便秘或腹瀉、食慾不振、血球數降低、失眠、下頷疼痛、手腳感覺異常（例如刺痛、麻木）的副作用。
- 若用藥期間出現過敏症狀、胸痛、呼吸困難、心跳變快變慢或不規則、意識不清、骨頭或肌肉劇烈疼痛、皮膚瘀青、尿量變少、排尿疼痛或有灼熱感、異常虛弱無力，應立刻告訴醫師。

衷心的叮嚀

- 若患有心衰竭、嚴重腎臟疾病、副甲狀腺疾病、口腔疾病或正在服用其他藥品，使用本藥品前要告訴醫師。
- 看牙齒時需告知牙醫師正在服用本藥品，用藥期間盡可能避免牙科手術。
- 使用本藥品期間應注意補充水分。
- 使用本藥品期間須使用避孕措施，若在治療當中發覺懷孕，請立即通知醫師。
- 服用骨復舒膠囊時，盡量空腹吞服，以增加藥品的吸收。



其他藥物

B. 預防或治療因骨轉移引起的骨折、
骨頭疼痛和血鈣上升

(二)、核因子 κ -B 配體受體致活劑
(RANKL)抑制劑：

學名 **Denosumab**

商品名 （用法：皮下注射）

Xgeva (癌骨瓦)

注意事項

1. 當出現以下症狀請立即與您的醫師聯絡：
 - a. 感染徵兆(發燒或發冷、喉嚨痛、耳痛或有分泌物、咳嗽有痰、排尿疼痛或有燒灼感)。
 - b. 藥物過敏現象(紅疹、皮膚癢、呼吸困難、喉嚨或胸部緊縮、嘴唇或舌頭腫大、臉腫)。
 - c. 下顎(巴)或口腔疼痛、心跳快速或不規律、異常疲倦或虛弱無力、肌肉僵硬或劇烈疼痛、手腳麻木或刺痛、嚴重腹痛、異常出血或瘀青。
2. 使用本藥品可能會產生皮膚局部刺激感、疲倦、背痛、肌肉疼痛、頭痛、腹部不適，這些症狀可自行或經處置後得到緩解，可詢問醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 看牙齒時需告知牙醫師正在使用本藥品，用藥期間盡可能避免牙科手術。
2. 若對乳膠過敏，請務必告知醫師或藥師。
3. 若曾經進行甲狀腺或副甲狀腺手術，請務必告知醫師或藥師。
4. 若正在使用抗凝血藥、化療藥、抗癲癇藥、類固醇、免疫抑制劑，請務必告知醫師或藥師。
5. 使用本藥品期間須使用避孕措施，若在治療當中發覺懷孕，請立即通知醫師。



其他藥物

C. 促進白血球數目增加

學名 **Filgrastim**

商品名 (用法：注射)

Filgrastim (惠爾血添)

學名 **Lenograstim**

商品名 (用法：注射)

Granocyte (顆球諾得)

學名 **Pegfilgrastim**

商品名 (用法：注射)

Neulasta (倍血添)

注意事項

1. 使用本藥品可能會有骨頭疼痛、頭痛、注射部位不適、輕微噁心嘔吐的副作用。
2. 雖然極少發生，但若服藥期間出現過敏症狀、胸痛、呼吸困難、心跳變快變慢或不規則、昏暈、不明原因發燒、皮膚瘀青、尿量或顏色改變、出現黃疸，應立刻告訴醫師。

衷心的叮嚀

1. 若正在服用鋰鹽治療，使用本藥品前要告訴醫師。
2. 需定期進行血液檢查。



6 近期新增化療藥品

學名 **Eribulin**

商品名 (用法：靜脈注射)


Halaven (賀樂維)

注意事項

1. 發燒或發冷、有痰的咳嗽、排尿疼痛或灼熱感等感染症狀，或有心律不整(心跳不規律)要立刻告知醫師。
2. 當出現手腳麻木或刺痛等感覺異常，可能是藥品引起的周邊神經病變，如果正在接受治療的階段，請在下次給藥前評估時告訴醫師，可能考慮下次劑量的調整。
3. 使用本藥品可能會產生禿髮、腹瀉、噁心、嘔吐、口腔黏膜炎、疲倦，這些症狀可自行或經處置後得到緩解；若發生時，請詢問你的醫師或藥師。

衷心的叮嚀

1. 若你正在或準備開始服用抗生素(特別是紅黴素類)、調適心情藥物、請務必告知醫師(避免增加心律不整的機率)。
2. 此藥物可能引起白血球下降、噁心嘔吐、食慾不振、脫髮、周邊神經病變，請參考常見副作用處理(本書第92、96、98、101頁)。





1 白血球低下

白血球細胞可幫助人體對抗感染，化療時常會降低骨髓製造白血球細胞的數目，最低點大多發生在化療後約7至12天時，此時最有可能發生感染。

常見之症狀

發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、鼻竇疼痛、耳朵疼痛、頸部僵硬或疼痛、排尿困難或疼痛等。

如何自我照護

1. 為了減少感染的機會，請注重衛生，加強洗手(也請您週圍的人時常洗手)。
2. 避免接觸罹患感冒等傳染性疾病之人；避免到人群聚集的公共場所。
3. 避免吃生的食物(如生魚片)、含生雞蛋之料理(如沙拉等)；選擇需要削皮的水果和多吃蔬菜，並請務必徹底清洗。
4. 定期量體溫(每日1~2次)。
5. 避免在白血球降低時進行牙科處置。

出現何種症狀時需就醫

1. 發燒（體溫超過38°C）、發冷。

2. 咳嗽、喉嚨痛、頭痛、鼻竇疼痛、耳朵疼痛、頸部僵硬或疼痛。
3. 小便有燒灼感、排尿困難或疼痛、急尿或頻尿、尿液渾濁。
4. 口腔內疼痛或有白色覆蓋物(尤其舌頭上)。
5. 身體任何部位有突發的疼痛。



2 血小板減少

化療會降低人體骨髓製造血小板的數目。血小板數目減少會降低血液凝集的能力而導致出血的傾向。

常見之症狀

瘀青、皮下有小紅點產生、血便、血尿、傷口不易止血等。

如何自我照護

1. 避免使用肛門栓劑，也不要由肛門量體溫。
2. 儘量避免做容易出血的動作(必要時請小心進行)，如剔牙、摳鼻子等。
3. 使用剪刀、刀子或其他尖銳器具時需小心避免受傷。
4. 使用電動刮鬍刀而不要用傳統式刮鬍刀片。

5. 使用軟毛牙刷刷牙。
6. 隨時穿鞋，勿打赤腳以保護足部。
7. 避免進行劇烈或碰撞性的運動或娛樂。
8. 萬一有出血時，請以乾淨紗布按壓出血部位至少5分鐘（或直至流血停止為止）。
9. 暫停服用非固醇類消炎止痛劑（例如阿斯匹靈、ibuprofen、naproxen等），並與開方醫師討論。
10. 看牙醫時請告知醫師或藥師您正在進行化療。

出現以下症狀時需就醫

1. 嚴重的頭痛、視覺變化或神智不清。
2. 自發性流血（非因受傷導致）。
3. 按壓5分鐘仍無法停止之出血。
4. 皮膚出現針狀紅點、異常出血或瘀血或口鼻流血。
5. 非經期之陰道出血或經期中之大量或長時間出血。
6. 尿中帶血（紅色或粉紅色尿）。
7. 黑色便或血便。



貧血

貧血是身體內沒有足夠的紅血球及血紅素。貧血令人感到十分疲倦和虛弱，然而化療、沮喪、睡眠障礙等也可能使人感到疲倦。

常見之症狀


感覺十分疲倦和虛弱、呼吸短促、心跳加速、快速變換姿勢時易頭暈、皮膚蒼白等。

如何自我照護

1. 多攝取高蛋白及富含鐵質之食物。
2. 安排足量的休息，夜間需有充足的睡眠（宜八小時以上），日間疲倦時可小歇（如會影響夜間睡眠，小歇原則上勿超過一小時）。
3. 調整作息，減輕工作量，必要時尋求他人之協助。
4. 依體能進行適度運動，例如每週幾次或每天出去公園散步、瑜伽等。

出現以下症狀時需就醫

1. 頭暈或昏厥。
2. 呼吸短促、心跳過快或有胸痛請立即就醫。



4 嘔心 / 嘔吐

並不是所有的化療藥物都會引起噁心或嘔吐。醫師會給予您最適合的止吐藥物來預防和治療噁心、嘔吐。

由於每個人對化療藥物及止吐藥物的反應不同，如果藥物不能達到預期的止吐效果，請告知您的醫師。

如何自我照護

1. 化療期間，請吃少量及清淡的餐飲，避免油膩及刺激性食物。
2. 避免刺激性的氣味。
3. 在嘔吐時暫停進食，嘔吐停止後應漸進的恢復進食。
4. 補充足量的水分以防脫水，但避免在進餐時喝飲料。
5. 安排愉悅的進餐環境，例如喜歡的音樂、有趣的影片或家人朋友的陪伴。
6. 室內要有新鮮的空氣，穿著寬鬆的衣物，餐後兩小時內避免躺平。
7. 依照醫師指示正確服用止吐藥物，如果仍感到噁心或會嘔吐，請告知醫師。

出現以下症狀時需就醫

1. 服用止吐藥物後仍持續發生噁心嘔吐。
2. 足以影響進食之噁心。
3. 24小時內超過4~5次之嘔吐。
4. 在嘔吐發生前會感到胃脹或胃痛。



5 口腔黏膜損傷

化療不僅破壞癌細胞，也破壞迅速分裂的細胞，如口腔和胃腸道內的黏膜細胞。

常見之症狀

口腔黏膜潰瘍，而造成疼痛或感染，進而導致進食、吞嚥、言語困難。

如何自我照護

1. 維持良好的口腔衛生。
2. 餐後及睡前用軟毛的牙刷刷牙。
3. 維持口腔與嘴唇濕潤，可用每杯(約240 c.c.)中加入0.5~1茶匙食鹽或小蘇打之開水漱口，避免使用含酒精的漱口水漱口和飲用含有酒精的飲料。

- 進食軟質、無刺激性易吞嚥之食物，進食時食物溫度勿太高。
- 在開始化療前二週先請牙醫師檢視，將口腔及牙齒的問題處理好。

出現以下症狀時需就醫

- 口腔或喉嚨疼痛厲害時，可請醫師開立藥物舒解症狀。
- 如有口腔或喉嚨感染，請立即就醫。



6 食慾不振

化療期間，您可能會遇到口味和食慾的變化和對某些氣味敏感，不要擔心，這種現象常見於化療後的前幾天或一個星期內。

如何自我照護

- 可少量多餐（每日5~6餐），盡量不要不進食，不進食可能會使症狀更嚴重。
- 建議攝取高蛋白、高熱量、營養均衡之飲食，避免油炸、油膩之食物及碳酸飲料。
- 請喝足量的液體，養成日間時常啜飲少量液體（如水、運動飲料或稀釋果汁等）之習慣，一般人每日宜攝取2000毫升以上之水份。

- 儘量維持適度之活動，例如每日進行短時間的散步，可幫助產生飢餓感。

出現以下症狀時需就醫

腹部持續疼痛。

腹瀉



一些化療藥物可能會引起腹瀉，但也可能有其他原因，例如感染、焦慮/壓力、乳糖不耐或其他藥物引起等。

常見之症狀

比平常次數多之軟便或水樣便。

如何自我照護

- 為了補充流失的體液，請補充足量之水分。
- 避免食用油炸、油膩或刺激性的食物。
- 避免食用可能惡化腹瀉之食物，如乳製品、含酒精飲料等。
- 未經醫師指示，請勿自行服用止瀉成藥。

出現以下症狀時需就醫

- 發燒(超過38°C)。

2. 在24小時內有超過三至四次水樣便或帶血的糞便。
3. 腹瀉或腹部絞痛超過一日。
4. 頭暈、口乾舌燥、並且皮膚乾燥。
5. 暗色尿(尿過濃)。



8 便秘

一些化療藥物和一些防止噁心或止痛的藥物，可能引起便秘。此外，也可能因為活動量減少、飲食習慣改變或水份攝取不足而出現便秘。

常見之症狀

排便次數減少或排便困難。

如何自我照護

1. 每日需喝足量的液體。
2. 適度的運動(例如每日散步或騎腳踏車15~30分鐘)。
3. 依照醫生的建議，使用軟便劑。
4. 如果可以接受，攝取高纖維食物，包括水果和蔬菜。

出現以下症狀時需就醫

1. 發燒。

2. 伴隨噁心、嘔吐之便秘。
3. 無法排氣。
4. 胃部腫脹或疼痛。
5. 超過二日未排便。

掉頭髮



9

一些化療藥物可能會傷害毛髮根部的毛囊細胞。通常化療開始約兩至三週後開始掉頭髮，大多數情況下，化療造成的掉頭髮是暫時性的，當停止化療後，頭髮將開始恢復生長，需要1至2個月才能看到一些頭髮，新的頭髮可能與舊的頭髮略有不同的顏色和質地，新的頭髮大多較柔軟、捲曲，經過一段時間後有可能會返回到原來的質地。頭髮生長的速度約每個月長四分之一英吋(0.635公分)，在六個月到一年後可長回全頭的頭髮。

常見之症狀

掉頭髮的程度依所用的化療藥物及劑量而不同。有些人會頭髮變稀(掉一部份的頭髮)，而另一些人可能會失去頭髮、睫毛、眉毛，以及其他體毛。

如何自我照護

1. 事先準備好軟質、質量輕、舒適、易穿戴且容易處理的

頭巾、帽子或假髮。

2. 放一條毛巾在枕頭上，可以較容易清理脫落的頭髮。
3. 清洗頭髮及頭皮需輕柔，避免染燙或熱捲頭髮。
4. 在治療中頭皮可能會癢、敏感及易受刺激，可考慮在接受化療前先將頭髮剪短或剃掉，會比較方便使用頭巾或假髮，減少頭皮的症狀及避免大量落髮的尷尬。
5. 需預防頭皮受寒，外出需防晒。

出現以下症狀時需就醫

落髮不致影響身體功能，如有必要，可尋求心理諮詢之支援。



10

皮膚／指甲色素沉澱

皮膚顏色與指甲的變異非常常見。每一種引起的藥物都有個別的型態，所以目前並沒有一個確定的理論解釋這些現象的產生。這些變化通常造成外觀上的困擾，並不會引起全身的不舒服。

常見之症狀

各個藥物引起的症狀各有不同，例如5-FU引起的症狀包括，皮膚與指甲顏色的改變；分佈於各處，有在陽光

暴露的部位發生，也有報告在舌頭與結膜發生塊狀的顏色變化，或廣泛的網狀變化，或在小關節、手掌、軀幹出現顏色變化；5-FU引起指甲分離、變藍色、萎縮、分半、增厚、甚至掉落。各種藥物造成的顏色不同，可能有黑色、藍色、綠色、或褐色；呈現方式有些以線條呈現，多個線條表示您接受多次的治療。

如何自我照護

1. 進行園藝工作或清潔工作時請戴手套，避免感染。
2. 維護皮膚與指甲的衛生。告訴醫師皮膚與指甲的異常變化，確認是否為感染所引起。

出現以下症狀時需就醫

皮膚與指甲的變異可能增加感染的可能性，若有感染的懷疑，應儘快通知醫師。



11

生殖機能損傷

化療藥物可能會傷害男女的生殖細胞，各種藥物對於女性的卵巢傷害程度不同，是否造成永久性的停經，可能與年紀最有關係，年齡越輕，停藥後卵巢恢復功能的可能性越大。化療藥物的劑量也很有關係，劑量越高，對於卵巢的傷害就越大。這些藥物不僅造成停經，也可能造成生殖細胞遺傳物質的變異，導致畸胎的可能性提高。

常見之症狀

卵巢功能下降的症狀與更年期症狀相似。例如，陰道乾澀與性交疼痛、性慾下降、熱潮紅、月經變少甚至停經。

如何自我照護

1. 若仍在生育年齡，請告訴醫師是否希望有孩子，因為這個訊息將會提供醫師不同的處理考量；若在治療當中發覺懷孕，請立即通知醫師。
2. 若在治療完成後想要懷孕，也請與醫師討論。



手足症候群

手足症候群是一種皮膚的反應，發生原因不明，可能因為少量藥物經由微血管滲漏在手掌或腳掌。這個症狀可能造成疼痛，甚至影響生活作息。

常見之症狀

較常見出現麻木感、灼熱感或搔癢、發紅或斑點、腫脹感、壓痛；較嚴重者可能會有皮膚皸裂、脫皮、水泡、劇烈疼痛，甚至影響步行與手部的動作。

如何自我照護

1. 避免長期讓手與腳暴露於較高的溫度下，因為高溫會使

血液循環較快，增加藥物的滲漏。建議避免用熱水洗碗或長時間泡澡。

2. 減少對於手掌腳掌的重壓(如按摩或用力搓洗)。
3. 服用可能造成手足症候群藥物期間，暫時停止跑步相關可能重壓腳掌的運動。

出現以下症狀時需就醫

嚴重疼痛以致無法正常行動時，可能需要醫師確認，止痛藥物可以緩解疼痛。



中文索引

- 五畫
冬培力 72
可立 76
可立寧 76
可舒得 72
二畫
力及美壯 70
力加生 70
力加多倫 70
力加通片 70
力克 70
力克能 71
力克爽 71
力克樂 70
力佳爽 71
力得 39
力速爽 70, 71
力達爽 70
力確多寧 71
卜林朗 78, 79
四畫
中美塞鬆 70
內胃朗 72
友復 57
引得暢錠 78
止吐錠 78
止敏吐 69
六畫
伊胃佳樂 78
伏摩素 36
吐平 72
吐必止 72
吐安 72
吐寧 72
七畫
好立明 82
好樂寧 78
安心平 76
司吐免 79
四環素 46
平派 78
平朗 78
弗瑞斯 34
必胃暢 78
必除癌 46
必諾賓 52
永胃健 78
永舒百克胃 78
立可特寧 70
立克能 70
立每頌 70
立消樂 78
立消諾 78
立爽朗 71
艾比魯素 41
伊胃佳樂 78
艾徽素 37
八畫
伯樂健朗 78
佐胃健 78
佑利生片 71
克莫抗癌 48
吐福 72
多普利杜 72
好樂寧 78
安可寧 82
安定文 76
安定寧 76
安祈平 76
安美達 24, 26
安神 76
安納柔 26
安素泰 36
安斯如 26
安嘔 74
安樂寧 76
安適胃寧 78
安靜 76
托樂胃朗 79
有利癌 44
汝加確寧 70
自體松 71
艾比魯素 41
艾徽素 37
九畫
刷炎 71
卓弗蘭 74
克儂強片 70
克爾癌 32
克癌 41
免吐寧 72
免痛 72
別吐 79
利加得隆 71
利可順 70
利吐寧 72
利康多能 70
利康能 70
利康諾 78
利解痛 71
利癌 37
快平吐 74
抑噁敏 82
抗吐 72
抗吐寧 78
杏胃特 79
杏骨樂 84
每保胃 79
每得平 79
汰杉 35
汰癌勝 36
貝福沛米卓 84
里克壯 70
十畫
佳洛菱 70
佳鉑帝 50
刷炎 71
卓固尼 84
卓骨弛 84
宜暢 78
帕米卓 84
帕特癌 36
別吐 79
明林倍朗 78
明特朗 78
易滅得庇福 46
服能靜 76
服樂癌 44
欣克吐 74
欣沛方 36
欣怡 76
欣得爽 71
治加鬆 71
法洛德 28
泛艾徽素 41
炎必寧 70
玫多邁 79
每保胃 79
的剎美剎松 71
每得平 79
的格美利松 71
汰癌勝 36
的確當 70
貝福沛米卓 84
里克壯 70
阿雷素 37
阿樂癌 48
佳洛菱 70
佳鉑帝 50
刷炎 71
卓弗蘭 74
保可寧 82
保胃 78
保胃朗 78
胃必朗 79
胃百朗 79
胃利空 72
胃利通 72
胃良 79

胃明朗 78
 胃朗 78
 胃益寧 72
 胃得倍朗 79
 胃得朗 79
 胃斯妥持續膠囊 78, 79
 英百朗 78
 迫利朗 78
 十畫
 倍血添 88
 泰嘉錠 24, 66
 泰慕菲 32
 泰靜 76
 特卡朗 70
 特可舒 70
 特克通 70
 特佳 70
 特康舒片 70
 特塞隆 70
 特體松 71
 益必信 41
 益彼欣 41
 益林 78
 納胃 72
 能滅瘤 53
 除胃障 72
 骨力強 84
 骨得寧 84
 骨復舒 84, 85
 高美塞鬆 70
 十一畫
 健仕 45
 健擇 45
 健彌達 45
 培胃通 72
 培朗 78
 培得 72
 培喚明 78
 康利斯 39
 康您適強 74
 康斯吐 74
 康寧適從 74
 得加 71
 得卡 71
 得卡朗 70
 得卡散 71
 得卡舒 70
 得卡隆 70
 得可爽 71
 得可爽片 70
 得立生 70
 得立速片 70
 得安朗 71
 得克隆 70
 得克寧 70
 得刪痛 70
 得佳 70
 得刻朗 71
 得刻通 70
 得刻當 71
 得定平 76
 得美松 71
 得美斯爽 71
 得朗 72
 得能速 71
 得康 70
 得爽 70, 71
 得速爽 71
 得舒爽 70
 得嘉能 70
 得爾康 72
 得撒鬆 71
 得確素寧片 70
 得適 32
 悠然 76
 敏速平 70
 梅得柏朗 79
 淨癌順 36
 統必林 71
 莫尼茲 74
 莫吐 72
 莫吐安 72
 莫吐能 72
 莫沙普萊得 81
 莫林 72
 莫痙 72
 莫舒博德 81
 通平 72
 通坦 72
 速立安 76
 十二畫

富多拉富 56
 復乳納 24, 30
 復癒 57
 惠腹糖 78
 惠爾血添 88
 斯理寧 71
 普化 78
 普克胃 78
 普林 78
 普林倍朗 79
 普洛陪拉辛 82
 普舒安 78
 普寧胃朗 78
 普寧朗 78
 普寧培寧 78
 普爾倍朗 78
 普樂明 82
 紫杉醇 36
 舒胃達 72
 賀疾妥 23, 65
 賀樂維 90
 賀癌平 22, 23, 24, 67
 賀癌寧 22, 59
 十三畫
 塞克羅邁得 43
 搏克力 36
 溫培朗 79
 溫諾平 52, 58
 溫鎮錠 76
 減殺除礙 46
 減惡速 31
 聖約翰草 27, 66
 腹消樂 79
 腹舒寧 72
 腹寧朗 78
 葉酸 46, 54
 補得樂美 78
 補樂美 78
 過敏當 70
 道喜 72
 達胃爽 72
 達噁寧 82
 鉑帝爾 48
 鉑特敏 48
 雷克送 70
 雷狄亞 84
 樂眠 76
 樂得平 76
 樂得靜 76
 樂寧靜 76
 樂靜 76
 樂穩錠 76
 滯導 79
 福特喜 56
 菲米索 84
 輔胃能 78
 頗安靜 82
 溫培朗 79
 溫諾平 52, 58
 溫鎮錠 76
 減殺除礙 46
 德壽魯素 37
 莫舒胃清 81
 敵他 70
 敵掃風濕片 71
 樂力靜 76
 樂平 76
 樂立舒平 76
 樂汝靜 76
 樂利舒錠 76
 樂來寧 76
 樂定平 76
 樂拉特 76
 樂治吐 72
 樂耐平 76
 樂胃康 78
 樂胃寧 72
 樂眠 76
 樂得平 76
 樂得靜 76
 樂寧靜 76
 樂靜 76
 樂穩錠 76
 歐樂得爽 70
 澎湃 82
 盤尼西林 46
 衛吐 72
 賦安特 74
 輝克癲蘇 36
 適吐朗 74
 適吐停 74
 鹼鹽 89

英文索引



- 十六畫
諾瓦得士 32
諾安命 82
諾敏 82
諾曼癌素 23, 24, 27
諾普惠 32
諾雷德 29
靜凡 76

十七畫
優佳朗 71
優得松 71
優腹 79
癌伏妥 23, 63
癌克平 36
癌思停 22, 61
癌骨瓦 86
癌喜芬 32
癌德星 43
癌療信 41
縮水蘋果酸丙氯倍拉辛 82
縮蘋酸普氯苯塞 82
臨胃舒 78
顆球諾得 88

十八畫
癲吐寧 72
禮康明 70
鎮吐寧 72
鎮舒胃 78
鎮嘔能 72
- 雙羥蒽醌 53
雙福全 45

二十畫
蘇普瑞 74
蘋果酸丙氯陪拉辛 82

二十三畫
體得適 32

- 5-FU 44, 102, 103

A
Abiplatin 48
Abitrexate 46
Aclasta 84
Ado-trastuzumab emtansine 22, 59
Adriblastina 37
Afinitor 63
Aloxi 74
Aminophylline 46
Anastrozole 26
Anazo 26
Ansuzole 26
Anthracin 41
Anxicam 76
Anxiedin 76
Anzatax 36
Anzepam 76
Aprepitant 69
Aredia 84
Arimidex 24, 26
Aromasin 23, 27
Aswell 78
Atilen 76
Atipam 76
Ativan 76
Atizepam 76
Avastin 61

B
Balon 78
Bevacizumab 22, 61
Biwesan 78
Bolenic 84
Bonviva 84
Bonefos 84

C
Caelyx 39
Capecitabine 54
Carboplatin 50, 68
Carolin 70
Chiaowelgen 78
Chitou 78
Anthracin 41
Cimetidine 41
Cisplatin 48, 68
Clodronate 84
Costi 72
Costine 72
Cyclophosphamide 43, 68
Cyclosporine 35

D
D. M. P. 72
Daolin 82
Daweison 72
Deca 70
Decadlin 70
Demeson 70
Denosumab 86
Dercon 72
Deson 70
Dexadon 70, 71
Dexadrol 71

Dexamesone	70	Doxorubicin	37, 68	Fosaprepitant	69
Dexamethasone	71	Doxorubicin DBL	37	Foselin	72
Dexan	70	Dringen	78	Fuletin	76
Dexaroid	70	Duoridone	72	Fulvestrant	28
Dexaron	70			Furil	57
Dexasolen	70	E		Futraful	56
Dexason	70	Eline	78	G	
Dexasone	70	Emelime	78	Gain-Tonin	72
Dexatone	70	Emend	69	Gastro-Timelets	78
Dexazone	70	Emetrol	72	Gemcitabine	45
Dexon	70	Emthexate PF	46	Gemflor	45
Dexsone	70	Endoxan	43	Gemita	45
Dexthameson	70	Enteran	78	Gemmis	45
Dica	70	Epicin	41	Gemzar	45
Dicosheun	70	Epicin Lyo	41	Gemzaxol	36
Dikinex Repe	78	Epirubicin	41, 68	Genetaxyl	36
Dimotil Repe	78	Ercazon	70	Eribulin	90
Dipertase	78	Erweichalo	78	Genolin	72
Docetaxel	35, 68	Esepacs	78	Genox	32
Dompe	72	Everolimus	23, 63	Gingsuwel	78
Dompedon	72	Exemestane	27	Goserelin	29
Domper	72			Granisetron	74
Domperan	72	F		Granocyte	88
Domperid	72	Fareston	34	Grantron	74
Domperidone	72	Faslodex	28	H	
Domten-CCPC	72	Femara	24, 30	Halaven	90
Domtoo	72	Filgrastim	88	Herceptin	67
Dorisom	70	Flacil	56	Hi-Methasone	70
Dosin	72	Fluorouracil	44, 68	Horompelin	78
Dotidone	72	Fluoro-Uracil	44	I	
Doxor	37	Folic acid	54		

Ibandronate	84	Lorazon	76	Metoperan	79
Ibuprofen	94	Lorilsu	76	Metopran	79
Imperan	78	Lorpin	76	Mevaperan	79
Intaxel	36	Lotamin	82	Mewellin	72
K		Lovamin	76	Mexaton	70
Kadcyla	22, 59	Lowen	76	Mid-Methasone	70
Kantuu	72	M		Mitoxantrone	53
Kemoplat	48	Matolon	78	Modone	72
ketoconazole	34, 35	Maxolone	78	Molin	72
Kolinin	76	Medesone	70	Mopride	81
Kovin Tong	70	Medewel	78	Mormal	82
Kyotil	74	Megace	31	Mosaprile	81
Kytril	74	Megaplex	31	Motaline	72
Kytron	74	Megejohn	31	Moten	72
L		Megestrol	31	Motilium	72
Lapatinib	24, 66	Mekei	31	Motin	72
Larpam	76	Meniperan	78	Motou	72
Lenograstim	88	Menton	72	Moturin	72
Letrozole	30	Mepram	78	N	
Leucovorin	54	Mepramide	79	Naproxen	94
Lidonin	72	Mestrol	31	Navelbine	52, 58
Linwels	78	Methasone	70	Navoban	75
Lipo-Dox	39	Methotrexate	46, 68	Neosolon	70
Liposomal Doxorubicin	39	Methotrexate DBL	46	Neulasta	88
Lopam	76	Methotrexate LEDERLE	46	Neuropam	76
Lorapam	76	Methu	79	Newedon	72
Lorat	76	Metoclopramide	78, 79	Newport	78
Lorazepam	76	Metoco	79	Nidoliun	72
Lorazin	76	Metomide	79	Nolvadex	32
		Metopelan	79	Novamin	82
				Novantrone	53

Novofen 32	Phyxol 36	Ramosetron 74
Novomit 82	Platamine 48	Rifampin 27, 33
Nugachenin 70	Platinex 48	Ronpiline 71
O	<i>Podokedon</i> 78	<i>Rotilium</i> 72
<i>Ondan</i> 74	<i>Ponpai</i> 82	<i>Roumin</i> 82
<i>Ondansetron</i> 74	<i>Poriran</i> 78	<i>Rowelcon</i> 78
<i>Onzod</i> 74	<i>Pormoxol</i> 36	
<i>Oradexon</i> 71	<i>Pramin</i> 78	S
<i>Otril</i> 74	<i>Prenperon</i> 78	<i>Selfison</i> 71
P	<i>Prevomic</i> 78	<i>Setoral</i> 74
<i>Paclitaxel</i> 36, 68	<i>Prilan</i> 78	<i>Setron</i> 74
<i>Paclitaxin</i> 36	<i>Primlan</i> 78	<i>Shuayan</i> 71
<i>Padelin</i> 76	<i>Primeran</i> 78	<i>Silence</i> 76
<i>Palonosetron</i> 74	<i>Primran</i> 78	<i>Sinclone</i> 84
<i>Pamidron</i> 84	<i>Primitase</i> 78	<i>Sinprim</i> 79
<i>Pamidronate</i> 84	<i>Priperim</i> 78	<i>Sinthato</i> 79
<i>Pamisol</i> 84	<i>Pripram</i> 78	<i>Spolin</i> 76
<i>Panbicin</i> 41	<i>Proazine</i> 82	<i>Stapam</i> 76
<i>Paraplatin</i> 50	<i>Prochlorperazine</i> 82	<i>Stomallin</i> 79
<i>Paspertase</i> 78	<i>Prochlozine</i> 82	<i>Sulinin</i> 71
<i>Pegfilgrastim</i> 88	<i>Promeran</i> 78	<i>Sundron</i> 71
<i>Pelidone</i> 72	<i>Prometin</i> 78	<i>Supren</i> 74
<i>Peptomet</i> 72	<i>Prowel</i> 78	<i>Suweida</i> 72
<i>Peridon</i> 72	<i>Pulin</i> 78	<i>Suweilan</i> 79
<i>Perjeta</i> 65	<i>Pulinpelin</i> 78	T
<i>Perone</i> 78	<i>Pulperan</i> 78	<i>Tadex</i> 32
<i>Pertuzumab</i> 23, 65	<i>Pusuan</i> 78	<i>Tagamet</i> 41
<i>Pharmorubicin</i> 41	<i>Putelome</i> 78	<i>Talex</i> 79
<i>Phenytoin</i> 46, 54	R	<i>Tamofen</i> 32

<i>Tamoplex</i> 32	<i>Weiperan</i> 79
<i>Tamoxifen</i> 32	<i>Weiskon</i> 79
<i>Taxifen</i> 32	<i>Weitul</i> 72
<i>Taxol</i> 36	<i>Wempty</i> 72
<i>Taxotere</i> 35	<i>Winperan</i> 79
<i>Teanlang</i> 71	<i>Wintin</i> 76
<i>Tegafur</i> 56	<i>Wyeanin</i> 72
<i>Tegafur / Uracil</i> 57	
X	
<i>Teva</i> 36	<i>Xeloda</i> 54
<i>Theophylline</i> 46	<i>Xgeva</i> 86
<i>Toremifene</i> 34	
<i>Torowilon</i> 79	Z
<i>Trastuzumab</i> 23, 67, 68	<i>Zofran</i> 74
<i>Tropisetron</i> 75	<i>Zoladex</i> 29
<i>Tykerb</i> 66	<i>Zoledronic Acid</i> 84
<i>Tyxan</i> 35	<i>Zometa</i> 84
U	<i>Zudaw</i> 79
<i>Ucalon</i> 71	
<i>Udexon</i> 71	
<i>UFUR</i> 57	
<i>Unisone</i> 71	
V	
<i>Vinorelbine</i> 52, 58	
<i>Volimin</i> 82	
<i>Vomiz</i> 74	
W	
<i>Warfarin</i> 28, 32, 34, 44, 54	
<i>Wei Lian</i> 79	

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

乳癌用藥手冊 / 林淑文等編著. --初版. --

臺北市：中華景康藥學基金會，2014. 06

面；公分

ISBN 978-986-82336-5-2 (平裝)

1. 乳癌 2. 藥物治療 3. 手冊

416.2352

103009087